

オナガザメ類 全水域

ニタリ (*Pelagic thresher *Alopias pelagicus**)

ハチワレ (*Bigeye thresher *Alopias superciliosus**)

マオナガ (*Common thresher *Alopias vulpinus**)



ニタリ



ハチワレ



マオナガ

管理・関係機関

- 国際連合食糧農業機関 (FAO)
- 中西部太平洋まぐろ類委員会 (WCPFC)
- 大西洋まぐろ類保存国際委員会 (ICCAT)
- インド洋まぐろ類委員会 (IOTC)
- みなみまぐろ保存委員会 (CCSBT)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (ワシントン条約: CITES)

最近の動き

2025年には世界的に見て資源評価に関する目立った動きは無かった。

利用・用途

肉は生鮮食品や燻製、塩干物として消費される。鰭はフカヒレスープの原料、皮は革製品の材料として利用されるほか、肝臓からはビタミン類が抽出される。

漁業の概要

日本の主要漁港におけるまぐろはえ縄等によるサメ類の種別水揚量は、水産庁による委託事業「日本周辺クロマグロ調査

委託事業報告書 (平成4~8年度、水産庁1993-1997)」「日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査委託事業 (平成9~12年度、水産庁1998-2001)」「日本周辺高度回遊性魚類資源調査委託事業 (平成13~17年度:水産総合研究センター2002-2006)」「日本周辺国際魚類資源調査 (平成18~27年度:水産総合研究センター2007-2011、2012-2016)」「国際漁業資源評価調査・情報提供事業 現場実態調査 (平成28~29年度:水産研究・教育機構2017-2018)」及び「水揚地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果 (平成30~31年度、令和2




図1. 日本の主要漁港へのオナガザメ類の水揚量 (1992~2024年)

～6年度：水産研究・教育機構 2019～2025）」によって調査が行われている。1992～2024年におけるオナガザメ類の総水揚げ量は16～706トンで、その内、はえ縄による水揚げ量が2014年を除き、24～591トンと大部分を占めており（1992～2024年：オナガザメ類総水揚げ量の約90%（2014年除く））、次に流し網による水揚げ量が多くなっている（オナガザメ類総水揚げ量の約10%（2014年除く））が、2024年は流し網による漁獲の割合が37%と例年より高くなった。オナガザメ類の水揚げ量を時系列で見ると、1992年の706トンをピークとして、2012～2013年の120トン前後まで緩やかに減少傾向を示したが、2014年は16トンと大きく減少した。その後、2015年には102トン、2016年には157トンと増加したが、2017年以降は再び減少に転じ、2018年の報告値は前年（2017年：153トン）から56トンまで大きく減少し、2019年には94トンに増加したが、その後は減少傾向を示している（図1）。2024年の水揚げ量は、前年と同等の38トンとなっているが、はえ縄による漁獲割合が97%（2023年）から63%に減少した。水揚げの多くを占めるはえ縄漁業のうち、近海はえ縄漁業と沿岸はえ縄漁業の漁船隻数を年別に集計した結果、調査期間を通じて減少傾向を示しており、努力量の減少が水揚げ量の減少の一因である可能性が考えられる（図1）。サメ類の総水揚げ量に占めるオナガザメ類の割合は1992年の約4.0%から減少傾向を示し、2021年以降は約0.4%となっている。

米国西岸では、マオナガを対象とした流し網漁業や遊漁が存在し、流し網漁業では1980年代初期には約1,700トンが水揚げされていたが、漁獲対象の転換や資源保護のための規制によって、隻数が大きく減少し、2014年には水揚げ量が14トンまで減少した（Teo *et al.* 2018）。豪州においては、オナガザメ類は遊漁の対象となる他、2011年初期まではインド洋に面する国々で地域的に消費され、欧州のマーケットでも食用として流通していたことが知られている（IOTC 2016a、2016b）。

生物学的特性

【分布】

ニタリは主に熱帯～亜熱帯の外洋域に分布するが、時に沿岸近くにも出現することもある。ハチワレは世界の熱帯～温帯の外洋域及び沿岸域に分布する。マオナガは、熱帯～温帯の冷水域に広く分布するが、主な出現は温帯域であり、沿岸性が強いとされる（図2）。鉛直分布については、ニタリは表層～水深152m、ハチワレが最も深く表層から少なくとも水深500m（多くの場合、100m以深）、マオナガは表層～水深366m（多くの場合、表層に分布）と報告されている（Compagno 2001）。マーシャル諸島近海で行われた、はえ縄漁具を日中に浸漬した調査では、ハチワレは水深240～360m、水温10～16℃、マオナガは水深160～240m、水温18～20℃の環境で漁獲率が高いことが示されている（Cao *et al.* 2011）。北西大西洋で報告されたマオナガの漁獲記録では、12～18℃の表面水温での漁獲が多い（Kneebone *et al.* 2020）。

メキシコ湾及び太平洋で行われたポップアップアーカイバルタグ（pop-up satellite archival tag：PSAT）及び超音波発信器による行動研究によれば、ハチワレの遊泳深度（図3）は成長段階によらず、夜間（10～130m）よりも日中（200～500m）




図2. オナガザメ類の分布（Compagno 2001）
色の濃い部分は信用できる情報に基づく既存の分布あるいは確かに分布していると思われるエリア、薄い部分は分布が推定されるもしくは不確実な情報に基づく分布エリアを示す。




図3. ハチワレの日周鉛直移動（Nakano *et al.* 2003）
縦軸が遊泳水深、横軸は日にちと時刻を示す。図中の曲線は水温の等深線を示す。

の方が深いこと（Nakano *et al.* 2003、Weng and Block 2004、Anderson *et al.* 2022）、これに伴い分布水温は夜間（メキシコ湾、ハワイ：20～26℃）の方が日中（メキシコ湾：6～12℃、

表 1. オナガサメ類 3 種の繁殖様式、産仔数、出生時の体長

種名	繁殖様式	産仔数(平均と範囲)	出生時の体長	出典
ニタリ	非胎盤型胎生、卵食型	2尾	— 158~190 cm (全長) 130~160 cm (全長) 130~144 cm (全長) 136~142 cm (全長) 137.8~142 cm (全長)	Otake and Mizue 1981 Liu <i>et al.</i> 1999 Compagno 2001 White 2007 Romero-Caicedo <i>et al.</i> 2014 Varghese <i>et al.</i> 2017
ハチワレ	非胎盤型胎生、卵食型	2尾(2~4尾)	100 cm (全長) 135~140 cm (尾鰭前長) — 118~135 cm (全長) 122 cm (全長)	Moreno and Morón 1992 Chen <i>et al.</i> 1997 White 2007 Varghese <i>et al.</i> 2017 Calle-Morán <i>et al.</i> 2023
マオナガ	非胎盤型胎生、卵食型	約4尾(1~4尾)	114~160 cm (全長)	Compagno 2001 Mancini and Amorim 2006 Natanson and Gervelis 2013 Campos-León <i>et al.</i> 2025

ハワイ：6~26℃）よりも高いことが示されている (Weng and Block 2004)。また、東部太平洋の南部カリフォルニアの湾曲部 (Southern California Bight) 及び大西洋熱帯域で行われた調査においても、同様の日周鉛直移動が確認されている (Aalbers *et al.* 2021, Coelho *et al.* 2015)。

カリフォルニア南部で行われたアーカイバルタグ及び超音波発信器による行動研究によれば、マオナガは大陸棚上の浅い海域を避け、沖合の深い場所を好み、日中は水温躍層の下もしくは躍層の上部を遊泳し夜間は躍層の上、混合層に留まることが明らかになった (Cartamil *et al.* 2010a, 2011)。また、未成年魚については、多くの時間を大陸棚上で過ごし、個体によっては生息場所に高い定住性を示すこと、鉛直的には表層 20 m に分布が限られること、昼の分布水深は夜よりも深いことがわかっている (Cartamil *et al.* 2010b)。また、追加の調査では、日中 50 m 以上の水深まで頻繁な鉛直移動を行い、最大 192 m まで移動すること、14~17℃の水温との関係性が最も高いこと、鉛直的な移動の範囲は体サイズに比例しないこと等が報告されている (Cartamil *et al.* 2016)。インド洋南東部で行われた調査では、マオナガの日周鉛直移動は餌生物の日周鉛直移動によって説明できることが示唆されている (Heard *et al.* 2018)。

フィリピンのセブ島とレイテ島付近で行われた調査によれば、音響タグを装着されたニタリ (14 個体) は追跡期間の 32% を海山で過ごし、42% の個体は追跡終了の際にこの場所にいることが確認されており、海山の特定の場所を好むことが示された (Oliver *et al.* 2019)。また、鉛直方向に表層から水温躍層 (深度 155~175 m) の下まで移動し、1 日の間に深度 250 m の 12℃から表層の 33℃までの水温帯を経験することが報告されている (Oliver *et al.* 2023)。紅海で行われた研究によれば、電子標識を装着されたニタリは日周鉛直移動を行い、日中は深度 200~300 m、夜間は深度 50~150 m に分布すること、これらの行動は溶存酸素量や中深層性魚類の鉛直移動と関連していることが可能性として指摘されている (Arostegui *et al.* 2020)。

太平洋における日本のはえ縄調査データの解析によれば、ハチワレの CPUE は熱帯域 (北緯 10~15 度、南緯 5~10 度) で高いこと、低緯度では幼魚や未成年魚が多く出現し高緯度になるほど大型個体の割合が高くなることが示唆されている

(Matsunaga and Yokawa 2013)。インド洋においても同様の傾向が見られる上、海域や体長階級によって性比が異なることが示されている (Fernandez-Carvalho *et al.* 2015b)。マオナガについても、インド洋北西部や北米西岸において水平・鉛直方向における性的棲み分けの存在が指摘されている (Compagno 2001)。

系群構造に関しては殆ど研究が行われていないが、近年のミトコンドリア DNA 及びマイクロサテライト (核 DNA) を用いた研究によれば、ニタリは太平洋の東部と西部で大きく遺伝的組成が異なることが明らかになっている (Cardenosa *et al.* 2014)。また、ミトコンドリア DNA の調節領域を用いて大西洋とケープタウン東沖 (インド洋海域) で漁獲されたハチワレを用いた分析において、地理的に明瞭な区分は認められず、対象海域内には明瞭な系群構造は確認されていない (Morales *et al.* 2018)。

【産卵・回遊】

ニタリ、ハチワレ、マオナガの繁殖様式はいずれも卵食・共食い型の非胎盤型胎生 (Otake and Mizue 1981, Gilmore 1983, Moreno and Morón 1992, Chen *et al.* 1997, Liu *et al.* 1999, White 2007, Natanson and Gervelis 2013, Varghese *et al.* 2017) である。産仔数の範囲は、ニタリが 2 尾 (Otake and Mizue 1981, Liu *et al.* 1999, White 2007, Romero-Caicedo *et al.* 2014, Varghese *et al.* 2017)、ハチワレが 2 尾 (最頻値、レンジは 2~4 個体) (Moreno and Morón 1992, Chen *et al.* 1997, White 2007, Varghese *et al.* 2017, Calle-Morán *et al.* 2023)、マオナガが平均 3.7 尾 (Natanson and Gervelis 2013) ないし 4 尾 (Mancini and Amorim 2006, Campos-León *et al.* 2025) と推定されている (表 1)。出生時の体長は、ニタリが全長 130~190 cm (Liu *et al.* 1999, Compagno 2001, White 2007, Romero-Caicedo *et al.* 2014, Varghese *et al.* 2017)、ハチワレが全長 100~135 cm (Moreno and Morón 1992, Varghese *et al.* 2017, Calle-Morán *et al.* 2023)、尾鰭前長 135~140 cm (Chen *et al.* 1997)、マオナガが全長 114~160 cm (Compagno 2001) で (表 1)、妊娠期間はニタリが 9 か月 (Romero-Caicedo *et al.* 2014)、ハチワレが 12 か月 (Compagno 2001)、マオナガが 9 か月 (Cailliet and Bedford 1983) と推定されている。




図 4. ニタリの成長曲線 (Liu *et al.* 1999、Drew *et al.* 2015、Carrillo-Colín *et al.* 2024、Mejía *et al.* 2024 より引用)




図 5. ハチワレの成長曲線 (Liu *et al.* 1998、Fernandez-Carvalho *et al.* 2011、2015a より引用)




図 6. マオナガの成長曲線 (Smith *et al.* 2008、Gervelis and Natanson 2013、Natanson *et al.* 2015 より引用)

交尾・出産期及び繁殖周期については、ニタリでは明瞭な交尾・出産期は報告されていないが(Liu *et al.* 1999、White 2007、Varghese *et al.* 2017)、東部太平洋では、胎子の発達の同調性から出産期の季節性を示唆する報告もある(Romero-Caicedo *et al.* 2014)。繁殖周期については、妊娠個体が周年観察されていることや、胎子と母体の卵巣卵の発達が同調していることから、休止期を挟まず毎年出産を行っている可能性が示唆されている(Liu *et al.* 1999、Romero-Caicedo *et al.* 2014、Varghese *et al.* 2017)。ハチワレでは、出産は季節性がなく周年行っていると推定されているが(Chen *et al.* 1997、White 2007、Varghese *et al.* 2017)、東部大西洋では秋～冬期の出産が他の時期に比べて多いと報告されている(Moreno and Morón 1992)。また、東部太平洋での報告によれば、妊娠個体(全長322～361 cm)は4～9月に観察され、胎子の観察とあわせて、妊娠期間は12か月で出産は8月に行われると推測されている(Calle-Morán *et al.* 2023)。繁殖周期については、胎子と母体の卵巣卵の発達が同調していることから、休止期を挟まず毎年出産を行っている可能性が示唆されている(Varghese *et al.* 2017)。マオナガでは、東部太平洋において夏期(7～8月)に交尾後、9か月の妊娠期間を経て春期(3～6月)に出産すると推定されている一方(Cailliet and Bedford 1983)、大西洋では、5～8月(Mancini and Amorim 2006、Natanson and Gervelis 2013)の出産期を経て交尾は秋に行われること、休止期を伴うため出産は毎年行われない可能性が指摘されている(Natanson and Gervelis 2013)。

ハチワレではイベリア半島南西部の沖合(Moreno and Morón 1992)が、マオナガではカリフォルニア南部等、温帯域の沿岸域(Compagno 2001、Cartamil *et al.* 2010b)が生育場と考えられている。

マオナガについては、北米西岸の個体群は季節回遊を行うと言われており、春季にバハ・カリフォルニアからカリフォルニア沖に北上し夏の間沿岸域に高密度に分布する。Kinney *et al.* (2020)によれば、Southern California Bightには様々な成長段階のマオナガが確認されること、マオナガ未成魚は当該海域に周年分布するが、垂成魚や成魚は春や夏にはBight外に移動すると推定されている。成熟雄は雌よりも北上しブリティッシュコロンビアまで到達するが、未成魚は低水温耐性が弱いためカリフォルニア中央部より北に移動することはなく、沿岸域の暖かく水深の浅い場所で多く見られる(Compagno 2001)。北米東岸では、深度200 m以下の沿岸域に主に分布し、雌雄や成長段階を問わず、夏に北上し冬に南下する季節的南北移動を示すことが報告されている(Kneebone *et al.* 2020)。

【成長・成熟】

脊椎骨に形成される輪紋から年齢が推定されており、ニタリについてはLiu *et al.* (1999)とDrew *et al.* (2015)がそれぞれ台湾近海、インドネシア近海、Carrillo-Colín *et al.* (2024)とMejía *et al.* (2024)がいずれも東部太平洋(メキシコ近海またはエクアドル近海)で漁獲された個体について(図4)成長式が報告されており、理論式に基づく推定では、寿命は22～38

表2. オナガザメ類3種の体長測定部位間の換算式

種名	測定部位 (x-y)	換算式	調査海域	出典
ニタリ	PCL-TL	雌: $TL = 1.93 \times PCL + 2.34$	北西太平洋	Liu <i>et al.</i> 1999
	PCL-TL	雄: $TL = 1.89 \times PCL + 2.33$	北西太平洋	同上
	TL-PL	雌: $TL = 1.7146 \times PL + 23.009$	東部太平洋	Romero-Caicedo <i>et al.</i> 2014
	TL-PL	雄: $TL = 1.7362 \times PL + 18.044$	東部太平洋	同上
	TL-PCL	雌雄込み: $PCL = 1.61 + 0.54 \times TL$	東部太平洋	Carrillo-Colín <i>et al.</i> 2024
	FL-PCL	雌雄込み: $PCL = 28.65 + 0.72 \times FL$	東部太平洋	同上
ハチワレ	PCL-TL	雌: $TL = 1.81 \times PCL + 15.3$	太平洋	Liu <i>et al.</i> 1998
	PCL-TL	雄: $TL = 1.76 \times PCL + 15.1$	太平洋	同上
	FL-TL	雌: $TL = 1.69 \times FL + 13.3$	太平洋	同上
	FL-TL	雄: $TL = 1.56 \times FL + 26.3$	太平洋	同上
	TL-FL	雌雄込み: $FL = 0.58 \times TL + 4.83$	大西洋	Fernandez-Carvalho <i>et al.</i> 2011
	FL-TL	雌雄込み: $TL = 1.7273 \times FL - 7.2529$	東部太平洋	Calle-Morán <i>et al.</i> 2023
	PL-TL	雌雄込み: $FL = 1.8232 \times PL + 0.7086$	東部太平洋	同上
マオナガ	TL-FL	雌雄込み: $FL = 0.5168 \times TL + 16.466$	大西洋	Gervelis and Natanson 2013

PL (原文より) 及び PCL は、ともに尾鰭前長を指す。TL 及び FL はそれぞれ全長、尾叉長を指す。

歳とされている (Carrillo-Colín *et al.* 2024)。ハチワレについては Liu *et al.* (1998)、Fernandez-Carvalho *et al.* (2011)、Fernandez-Carvalho *et al.* (2015a) がそれぞれ台湾近海、北東大西洋の熱帯域、大西洋全域で漁獲された個体を対象として (図5)、マオナガについては Smith *et al.* (2008) が北東太平洋、Gervelis and Natanson (2013) 及び Natanson *et al.* (2015) が北西大西洋で漁獲された個体を対象として (図6)、成長式を推定しており、北東太平洋の個体についてはオキシテトラサイクリン (oxytetracycline: OTC) に基づく輪紋形成周期のバリデーションが報告されている (Spear *et al.* 2023)。

成熟体長は、ニタリでは雄が全長 254.96~276 cm (Liu *et al.* 1999、White 2007、Romero-Caicedo *et al.* 2014、Varghese *et al.* 2017)、尾鰭前長 130.1~144.3 cm (Romero-Caicedo *et al.* 2014、Briones-Mendoza *et al.* 2021、Mejía *et al.* 2024、Carrillo-Colín *et al.* 2025)、雌が全長 282~292 cm (Liu *et al.* 1999、White 2007、Romero-Caicedo *et al.* 2014、Varghese *et al.* 2017)、尾鰭前長 139.0~151.4 cm (Romero-Caicedo *et al.* 2014、Carrillo-Colín *et al.* 2025)、ハチワレでは、雄が全長 263.5~287.6 cm (Moreno and Morón 1992、Chen *et al.* 1997、White 2007、Varghese *et al.* 2017、Calle-Morán *et al.* 2023)、尾叉長 159.2 cm (Fernandez-Carvalho *et al.* 2015b)、尾鰭前長 138.7 cm (Briones-Mendoza *et al.* 2021)、雌が全長 310.69~341.1 cm (Chen *et al.* 1997、Varghese *et al.* 2017、Calle-Morán *et al.* 2023)、尾叉長 208.6 cm (Fernandez-Carvalho *et al.* 2015b)、マオナガでは、雄が全長 293~311 cm (Smith *et al.* 2008)、尾叉長 181~198 cm (Natanson and Gervelis 2013)、雌が全長 303 cm (Smith *et al.* 2008)、尾叉長 208~224 cm (Natanson and Gervelis 2013) と推定されている。成熟年齢は、ニタリでは雄が 5 (Mejía *et al.* 2024) ~6.8 歳 (Carrillo-Colín *et al.* 2025)、7~8 歳 (Liu *et al.* 1999、Carrillo-Colín *et al.* 2024) ~10.4 歳 (Drew *et al.* 2015)、雌が 8.0~9.5 歳 (Liu *et al.* 1999、Carrillo-Colín *et al.* 2024、Carrillo-Colín *et al.* 2025) ~13.2 歳 (Drew *et al.* 2015)、ハチワレでは雄が 9~10 歳 (Liu *et al.* 1998)、雌が 13.4 歳 (Liu *et al.* 1998)、マオナガでは雄が 4.8 (Smith *et al.* 2008) ~8 歳 (Natanson *et al.* 2015)、雌が 5.3 (Smith *et al.* 2008) ~13 歳 (Natanson *et al.* 2015) と推定されている。

なお、上記の体長については、測定部位が尾鰭前長、尾叉長、全長と、様々であるため、これまで公表されている測定部位間の換算式を表2に引用する。

【食性・捕食者】

ペルー北部で捕獲されたニタリ 38 個体を含むオナガザメ類 128 個体の胃内容物を調べた結果、アメリカオオアカイカが優占しており、本種の食性は選択性が高いと推定されている (González-Pestana *et al.* 2018)。エクアドル近海で報告されたニタリの胃内容物を分析した報告においても、アカイカ、アメリカオオアカイカ、トビイカ、チリヘイクが優占しており、栄養的地位の幅は狭く、栄養段階は高次捕食者に特徴的な値である 5.0 と推定されている (Calle-Morán and Galván-Magaña 2020)。同海域のニタリを対象に、雌雄や成長段階ごとに安定同位体比を分析した研究によれば、同位体比の値はいずれも類似しており、外洋域の浅い水深帯の餌生物を利用していること、イカ類、特にアカイカが主要な餌生物であることが報告されている (Calle-Morán *et al.* 2023)。インド洋で報告された論文によると、ハチワレ (52 個体) の胃内容物は、魚類 (ヒラソウダ・グルクマ・マルソウダ) が 88.7% を占め、次いで頭足類が 9.1% を占めており、その多様性は体長と共に変化していた (Mohanraj *et al.* 2024)。

資源状態

現在、マグロ類地域漁業管理機関 (RMFO) において、オナガザメ類の資源水準の推定はどの大洋でも行われていないが、太平洋、大西洋、インド洋において、はえ縄漁業を対象とした生態学的リスク解析が行われている。太平洋共同体事務局 (SPC) が行った太平洋の解析結果によれば、オナガザメ類のリスク (脆弱性) は“中程度”と評価されたが (Kirby and Hobday 2007)、ICCAT が行った大西洋の結果では、ICCAT 海域で主に漁獲または混獲される代表的な板鰓類 20 種の中でハチワレは最も脆弱~3 番目 (評価方法によって異なる) に脆弱な種であると推定されている (ICCAT 2017)。大西洋の解析では、ハチワレの生産力が他の種に比べて低いとされていることが本種の脆弱性が高いと推定された主な要因と考えられる (Cortés *et*

al.2010)。IOTCが行ったインド洋の結果でも、ハチワレは非常に脆弱な種であることが示唆されている (IOTC 2012)。

北米西海岸で漁獲されるマオナガについては、アメリカ海洋大気局 (NOAA) のアメリカ海洋漁業局 (NMFS) により、米国及びメキシコの漁業データに基づき、統合モデルを用いた資源評価が行われている (Teo *et al.* 2018)。2018年に行われた資源評価では、2016年に設定した再生産や自然死亡に関するパラメーターの見直しを行い、生産力が低い設定で資源状態の再評価が行われた (資源評価期間: 1969~2014年)。その結果、推定された漁獲量の強さは、乱獲状態の指標となる値を大きく下回り、2014年時点の親魚量は開発前のレベルの62%と推定されており、MSY水準に相当する親魚量を大きく上回ることから、本系群は乱獲状態になく過剰漁獲の状態にもないことが示された。本系群は、過去には過剰漁獲により個体数が大きく減少したものの、その後の厳しい漁業管理の導入により、2006年以降緩やかに回復が続いているとされている。

この他、SPCの専門家グループが報告した中西部太平洋水域の漁業データに基づくオナガサメ類の資源状態の傾向分析によれば、はえ縄漁業における主な漁獲は東経170度以東、南緯10~北緯20度で見られること、漁獲物の多くは未成熟個体であること、漁獲率は1995~2001年にかけて増加し、その後2003~2011年にかけてわずかに減少傾向を示し、2012~2014年に急激に減少していることが示されている (Rice *et al.* 2015)。その後、FAOのABNJ (Areas Beyond National Jurisdiction) プロジェクトとして、米国と日本がSPCの保有するオプザーバーデータや漁獲統計データを加えた包括的な解析を行い、太平洋全域におけるハチワレの持続可能性に対するリスクを評価 (MIST (maximum impact sustainable threshold)) に基づくリスク評価) し、その結果が2017年のWCPFC第13回科学委員会で発表された。このリスク評価は、放流後の死亡率 (100%、30~70%) を含め、幾つかのパラメーターについて複数のシナリオを考慮し、「現行の漁獲量」が「本系群が持続可能なレベルの漁獲量」を超える確率 (絶滅リスク) に基づいて実施された。その結果、管理基準値を r (内的自然増加率) の半分 ($0.5r$) または r の4分の3 ($0.75r$) とした場合、推定される絶滅リスクは大きく変動し (Common Oceans (ABNJ) Tuna Project 2017)、現状では本系群のリスク評価における管理基準値の定義も定まっていないことから、WCPFC科学委員会は本委員会に対して、適切な限界管理基準値の定義やその上限を超過した場合のリスク許容度を検討する必要があると報告した (WCPFC 2017)。

近年、複数のマグロ類 RFMO でオナガサメ類の資源管理措置が実施されており、これら保存管理措置の有効性の検討や最適な放流方法 (best handling practice) の開発を目的とした調査が行われている。これらの調査は主にはえ縄で漁獲された生存個体を対象に、電子標識を装着するもので、米国西海岸でハチワレに対して行われた研究によれば、放流した14個体のうち12個体は放流後30日間生存し、1個体は放流後すぐに死亡し、残り1個体は放流後6時間後に何者かに捕食されたことから、30日間の放流後生存率は86% (捕食された個体も死亡に含める) ~92% (捕食された個体は死亡に含めない) と推定されている (Sepulveda *et al.* 2019)。IOTCの生態系混獲作

業部会では、2018年からハチワレを対象とした資源管理措置 (生存放流) の有効性を検証するための標識放流調査が実施されており、我が国も本調査に参画している。2020年7月にはインド洋においてハチワレ1個体の標識放流を行い、放流後60日間の生存を確認、報告した。

管理方策

現在、ICCATにおいてハチワレの船上保持禁止措置 (Recommendation 09-07) が、IOTCにおいてオナガサメ類3種の船上保持禁止措置 (Resolution 25/08) が実施されている。この他、全てのマグロ類 RFMO において、漁獲されたサメ類の完全利用 (頭部、内臓及び皮を除く全ての部位を最初の水揚げまたは転載まで船上で保持すること) 及び漁獲データ提出が義務付けられており、2019年のWCPFCでは、水揚げまで鰭を胴体から切り離さない (fins-naturally-attached) ことを原則とする一方、その代替措置として、(ア) 切り離した鰭と胴体を同じ袋に保管する、(イ) 鰭と胴体を縄やワイヤーで結びつける、または(ウ) 魚体と鰭に個体を識別可能な番号を付したタグを装着し、保管場所を記録するとの3つの代替措置も使用を可能とすることに合意した。IATTCも、2023年に同様の措置に合意している。WCPFCについては、2024年の年次会合において、代替措置のうち(ア)を廃止し、(ウ)については保管場所を同じ魚艙とし、また代替措置は、可能な限りサメを魚艙へ入れる前に処理を行うことに合意した。IOTCも、2025年の年次会合において、WCPFCと同様の代替措置とし、代替措置を取る場合は国ごとにいずれかの代替措置を選択することに合意している。加えて、WCPFCでは、2014年の年次会合において、①マグロ・カジキ類を対象とするはえ縄漁業は、ワイヤーリーダー (ワイヤー製の枝縄及びはりす) またはシャークライン (浮き玉または浮縄に接続された枝縄) のいずれかを 사용하지 ないこと (ワイヤーリーダーやシャークラインの詳細については、「用語解説」を参照のこと)、②サメ類を対象とするはえ縄漁業は、漁獲を適切な水準に制限するための措置等を含む管理計画を策定すること、が合意されている。①については、2022年の第20回年次会合で、北緯20度と南緯20度の間の水域では、両方を使用しないことに合意した。IATTCでも、2016年の年次会合で、シャークラインの使用禁止を内容とする決議が採択され、2018年1月1日から義務付けられた。さらに、IOTCにおいても、決議25/08 (Resolution 25/08) にて、漁獲されたサメ類の保全に関して、①はえ縄漁業におけるシャークラインの使用禁止、②南緯20度以北でのワイヤーリーダーの使用制限、が合意されている。

2016年9~10月に開催されたCITES第17回締約国会合において、ハチワレ (類似種規定により、オナガサメ類3種全て) を附属書IIに掲載する提案が行われ、投票の結果、可決された。この決定は2017年10月4日から発効し、オナガサメ類の魚体、鰭等を含む一切の派生物を貿易する際は、輸出国による輸出許可書の発給が必要となり、公海域で採捕し自国に持ち帰る行為 (海からの持込み) についても証明書の発給が義務付けられている。しかしながら我が国は、商業漁業対象種は持続的利用の観点、漁業管理主体である地域漁業管理機関または沿岸国・地域が適切に管理していくべきとの立場等から、本種の附

属書II掲載について留保している。このため、本種を締約国に輸出する場合には輸出許可書が必要となるものの、海からの持ち込みについての証明書の発給は不要となっている。

執筆者

かつお・まぐろユニット

さめ・かじきサブユニット

水産資源研究所 水産資源研究センター

広域性資源部 まぐろ第4グループ

仙波 靖子・高橋 将馬

参考文献

- Aalbers, S. A., Wang, M., Villafana, C., and Sepulveda, C. A. 2021. Bigeye thresher shark *Alopias superciliosus* movements and post-release survivorship following capture on linked buoy gear. *Fish. Res.*, 236: 105857. Doi: 10.1016/j.fishres.2020.105857
- Anderson, T., Meese, E. N., Drymon, J. M., Stunz, G. W., Falterman, B., Menjivar, E., and Wells, R. J. D. 2022. Diel Vertical Habitat Use Observations of a Scalloped Hammerhead and a Bigeye Thresher in the Northern Gulf of Mexico. *Fishes*, 7(4):148. Doi: 10.3390/fishes7040148
- Arostegui, M. C., Gaube, P., Berumen, M. L., DiGiulian, A., Jones, B. H., Røstad, A., and Braun, C. D. 2020. Vertical movements of a pelagic thresher shark (*Alopias pelagicus*): insights into the species' physiological limitations and trophic ecology in the Red Sea. *Endang. Species Res.*, 43: 387-394. Doi: 10.3354/esr01079
- Briones-Mendoza, J., Carrasco-Puig, P., and Toala-Franco, D., 2021. Reproductive biology aspects of *Alopias pelagicus* and *A. superciliosus* (Lamniformes: Alopiidae) in the Ecuadorian Pacific. *Neotrop. Ichthyol.*, 19: e210015. Doi: 10.1590/1982-0224-2021-0015
- Cailliet, G. M., and Bedford, D. W. 1983. The biology of three pelagic sharks from California waters, and their emerging fisheries: a review. *CALCOFI Rep.*, XXIV: 57-69.
- Calle-Morán, M., and Galván-Magaña, F. 2020. Diet composition and feeding habits of the pelagic thresher shark *Alopias pelagicus* in Eastern Central Pacific Ocean, Ecuadorian waters. *JMBA*, 100: 837-845. Doi: 10.1017/S0025315420000569
- Calle-Morán, M. D., Looor-Andrade, P. J., and Galván-Magaña, F. 2023. Trophic chain of the pelagic thresher, *Alopias pelagicus*, in the Southeastern Pacific Ocean: An approach through stable isotopes of carbon and nitrogen. *Food Webs*, ISSN 2352-2496, 36: e00294. Doi: 10.1016/j.fooweb. 2023.e00294
- Cao, D. M., Song, L. M., Zhang, Y., Lv, K. K., and Hu, Z. X. 2011. Environmental preferences of *Alopias superciliosus* and *Alopias vulpinus* in waters near the Marshall Islands. *New. Zeal. J. Mar. Freshw.*, 45: 103-119.
- Cardenosa, D., Hyde, J., and Caballero, S. 2014. Genetic diversity and population structure of the pelagic thresher shark (*Alopias pelagicus*) in the Pacific Ocean: evidence for two evolutionarily significant units. *PLOS ONE*, 9(10): e110193.
- Carrillo-Colín, L. D., Márquez-Farías, J. F., Castillo-Géniz, J. L., and Zamora-García, O. G. 2025. Age and Length at Maturity of Pelagic Thresher (*Alopias pelagicus*) in the Mexican Pacific. *Thalassas* 41, 73. Doi: 10.1007/s41208-025-00828-0
- Carrillo-Colín, L. D., Márquez-Farías, J. F., and Zamora-García, O. G. 2024. Bayesian estimation of the age and growth of the pelagic thresher shark (*Alopias pelagicus*) from the Mexican Pacific. *Environ. Biol. Fish.*, 107: 927-943. Doi: 10.1007/s10641-024-01592-5
- Cartamil, D. P., Sepulveda, C. A., Wegner, N. C., Aalbers, S. A., Baquero, A., and Graham, J. B. 2011. Archival tagging of subadult and adult common thresher sharks (*Alopias vulpinus*) off the coast of southern California. *Mar. Biol.*, 158: 935-944.
- Cartamil, D., Wegner, N. C., Aalbers, S., Sepulveda, C. A., Baquero, A., and Graham, J. B. 2010a. Diel movement patterns and habitat preferences of the common thresher shark (*Alopias vulpinus*) in the Southern California Bight. *Mar. Freshw. Res.*, 61: 596-604.
- Cartamil, D., Wegner, N. C., Kacev, D., Ben-aderet, N., Kohin, S., and Graham, J. B. 2010b. Movement pattern and nursery habitat of juvenile thresher sharks *Alopias vulpinus* in the Southern California Bight. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 404: 249-258.
- Cartamil, D., Wraith, J., Wegner, N. C., Kacev, D., Lam, C. H., Santana-Morales, O., Sosa-Nishizaki, O., Escobedo-Olvera, M., Kohin, S., Graham, J. B., and Hastings, P. 2016. Movements and distribution of juvenile common thresher sharks *Alopias vulpinus* in Pacific coast waters of the USA and Mexico. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 548: 153-163.
- Chen, C. T., Liu, K. M., and Chang, Y. C. 1997. Reproductive biology of the bigeye thresher shark, *Alopias superciliosus* (Lowe, 1839) (Chondrichthyes: Alopiidae), in the northwestern Pacific. *Ichthyol. Res.*, 44: 228-235.
- Coelho, R., Fernandez-Carvalho, J., and Santos, M. N. 2015. Habitat use and diel vertical migration of bigeye thresher shark: Overlap with pelagic longline fishing gear. *Mar. Environ. Res.*, 112: 91-99.
- Common Oceans (ABNJ) Tuna Project. 2017. Pacific-wide sustainability risk assessment of bigeye thresher shark (*Alopias superciliosus*). *WCPFC-SC13-2017/SA-WP-11 (rev 2)*. 102 pp.
- Compagno, L. J. V. 2001. *FAO species catalog, Vol. 4: Sharks of the world; Part 2 - Bullhead, mackerel and carpet sharks.* Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, Italy. 269 pp.
- Cortés, E., Arocha, F., Beerkircher, L., Carvalho, F., Domingo, A., Heupel, M., Holtzhausen, H., Santos, M. N., Ribera, M., and Simpfendorfer, C. 2010. Ecological risk assessment of pelagic sharks caught in Atlantic pelagic fisheries. *Aquat. Living*

- Resour., 23: 25-34.
- Drew, M., White, W.T., Dharmadi, Harry, A.V., and Huveneers, C. 2015. Age, growth and maturity of the pelagic thresher *Alopias pelagicus* and the scalloped hammerhead *Sphyrna lewini*. J. Fish. Biol., 86: 333-354.
- Fernandez-Carvalho, J., Coelho, R., Erzini, K., and Santos, M.N. 2011. Age and growth of the bigeye thresher shark, *Alopias superciliosus*, from the pelagic longline fisheries in the tropical northwestern Atlantic Ocean, determined by vertebral band counts. Aquat. Living Resour., 24: 359-368.
- Fernandez-Carvalho, J., Coelho, R., Erzini, K., and Santos, M.N. 2015a. Modelling age and growth of the bigeye thresher (*Alopias superciliosus*) in the Atlantic Ocean. Fish. Bull., 113: 468-481.
- Fernandez-Carvalho, J., Coelho, R., Mejuto, J., Cortés, E., Domingo, A., Yokawa, K., Liu, K.M., García-Cortés, B., Forselledo, R., Ohshimo, S., Ramos-Cartelle, A., Tsai, W.P., and Santos, M.N. 2015b. Pan-Atlantic distribution and reproductive biology of the bigeye thresher, *Alopias superciliosus*. Rev. Fish. Biol. Fisheries, 25: 551-568.
- Gervelis, B.J., and Natanson, L.J. 2013. Age and growth of the common thresher shark in the western north Atlantic Ocean. Trans. Am. Fish. Soc., 142: 1535-1545.
- Gilmore, R.G. 1983. Observation on the embryos of the longfin mako, *Isurus paucus*, and the bigeye thresher, *Alopias superciliosus*. Copeia, 2: 375-382.
- González-Pestana, A., Acuña-Perales, N., Córdova, F., Coasaca, J., Alfaro, E., Alfaro-Shigueto, J., and Mangel, J.C. 2018. Feeding habits of thresher sharks *Alopias* sp. in northern Peru: predators of Humboldt squid (*Dosidicus gigas*). JMBA, 99: 695-702.
- Heard, M., Rogers, P.J., Bruce, B.D., Humphries, N.E., and Huveneers, C. 2018. Plasticity in the diel vertical movement of two pelagic predators (*Prionace glauca* and *Alopias vulpinus*) in the southeastern Indian Ocean. Fish. Oceanogr., 27: 199-211.
- ICCAT. 2017. Report of the standing committee on research and statistics (SCRS), Section 8.13, Executive Summary - Sharks. 215-244 pp.
- IOTC. 2012. Report of the Eighth Session of the IOTC Working Party on Ecosystems and Bycatch, Cape Town, South Africa, 17-19 September, 2012. IOTC-2012-WPEB08 Rev[E]. 77 pp.
- IOTC. 2016a. Bigeye thresher shark Supporting information. 5 pp.
https://iotc.org/sites/default/files/documents/science/species_summaries/english/Bigeye%20thresher%20shark%20Supporting%20Information.pdf (2025年11月4日)
- IOTC. 2016b. Pelagic thresher shark Supporting information. 4 pp.
https://iotc.org/sites/default/files/documents/science/species_summaries/english/Pelagic%20thresher%20shark%20Supporting%20Information.pdf (2025年11月4日)
- Kinney, M.J., Kacev, D., Sippel, T., Dewar, H., and Eguchi, T. 2020. Common thresher shark *Alopias vulpinus* movement: Bayesian Inference on a data limited species. Mar. Ecol. Prog. Ser., 639: 155-167. Doi: 10.3354/meps 13271
- Kirby, D.S., and Hobday, A. 2007. Ecological Risk Assessment for species caught in the WCPO tuna fishery: updated Productivity-Susceptibility Analysis. Third Scientific Committee Meeting of the Western and Central Pacific Fisheries Commission, Honolulu, USA, 13-24 August 2007. WCPFC-SC3-EB SWG/WP-1. 20 pp.
- Kneebone, J., Bowlby, H., Mello, J.J., McCandless, C.T., Natanson, L.J., Gervelis, B., Skomal, G.B., Kohler, N., and Bernal, D. 2020. Seasonal distribution and habitat use of the common thresher shark (*Alopias vulpinus*) in the western North Atlantic Ocean inferred from fishery-dependent data. Fish. Bull., 118: 399-412. Doi: 10.7755/FB.118.4.8
- Liu, K.M., Chen, C.T., Liao, T.H., and Joung, S.J. 1999. Age, growth and reproduction of the pelagic thresher shark, *Alopias pelagicus* in the northwestern Pacific. Copeia, 1: 68-74.
- Liu, K.M., Chiang, P.J., and Chen, C.T. 1998. Age and growth estimates of the bigeye thresher shark, *Alopias superciliosus*, in northeastern Taiwan waters. Fish. Bull., 96: 482-491.
- Mancini, P.L., and Amorim, A.F. 2006. Embryos of common thresher shark *Alopias vulpinus* in southern Brazil, south Atlantic Ocean. J. Fish. Biol., 69: 318-321.
- Matsunaga, H., and Yokawa, K. 2013. Distribution and ecology of bigeye thresher *Alopias superciliosus* in the Pacific Ocean. Fish. Sci., 79: 737-748.
- Mejía, D., Mero-Jiménez, J., Briones-Mendoza, J., Mendoza-Nieto, K., Mera, C., Vera-Mera, J., Tamayo-Vega, S., Hernández-Herrera, A., Galván-Magaña, F. 2024. Life history traits of the pelagic thresher shark (*Alopias pelagicus*) in the Eastern-Central Pacific Ocean. Reg. Stud. Mar. Sci., ISSN 2352-4855, 78: 103795. Doi: 10.1016/j.risma.2024.103795.
- Mohanraj, T., Jebarani Rajathy, T., Sherly Cross, S.R.T. 2024. Length-weight relationship, condition factor, and diet analysis of thresher sharks (Family: Alopiidae) along the southern coast of India, Fish. Res., 277: 107067. ISSN 0165-7836. Doi: 10.1016/j.fishres.2024.107067.
- Morales, M.J.A., Mendonça, F.F., Magalhães, C.O., Oliveira, C., Coelho, R., Santos, M.N., Cruz, V.P., Piercy, A., Burgess, G., Hazin, F.V., and Foresti, F. 2018. Population genetics of the bigeye thresher shark *Alopias superciliosus* in the Atlantic and Indian Oceans: implications for conservation. Rev. Fish. Biol. Fisheries., 28: 941-951.
- Moreno, J.A., and Morón, J. 1992. Reproductive biology of the bigeye thresher shark, *Alopias superciliosus* (Lowe, 1839). Aust. J. Mar. Freshw. Res., 43: 77-86.
- Nakano, H., Matsunaga, H., Okamoto, H., and Okazaki, M. 2003. Acoustic tracking of bigeye thresher shark *Alopias superciliosus* in the eastern Pacific Ocean. Mar. Ecol. Prog.

- Ser., 265: 255-261.
- Natanson, L.J., and Gervelis, B.J. 2013. The reproductive biology of common thresher shark in the western north Atlantic Ocean. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 142: 1546-1562.
- Natanson, L.J., Hamady, L.L., and Gervelis, B.J. 2015. Analysis of bomb radiocarbon data for common thresher sharks, *Alopias vulpinus*, in the northwestern Atlantic Ocean with revised growth curves. *Environ. Biol. Fish.*, 99: 39-47.
- Oliver, S. P., Grothues, T. M., Mayo, Z. J., Williams, A. L., Silvana, M. and Cases, G. 2023. Depth and temperature profiles reflect individual differences in the daytime diving behaviours of pelagic thresher sharks. *Front. Mar. Sci.*, 10: 1128473. Doi: 10.3389/fmars.2023.1128473
- Oliver, S.P., Grothues, T.M., Williams, A.L., Cerna, V., Silvana, M., Cases, G., Reed, M., and Christopher, S. 2019. Risk and resilience: High stakes for sharks making transjurisdictional movements to use a conservation area. *Biol. Conserv.*, 230: 58-66.
- Otake, T., and Mizue, K. 1981. Direct evidence for oophagy in thresher shark, *Alopias pelagicus*. *Jpn. J. Ichthyol.*, 28: 171-172.
- Rice, J., Tremblay-Boyer, L., Scott, R., Hare, S., and Tidd, A. 2015. Analysis of stock status and related indicators for key shark species of the Western Central Pacific Fisheries Commission Rev 1 (29 July 2015). WCPFC-SC11-2015/EB-WP-04-Rev 1. 146 pp.
<https://meetings.wcpfc.int/node/9137> (2025年11月4日)
- Romero-Caicedo, A.F., Galvan-Magana, F., and Martinez-Ortiz, J. 2014. Reproduction of the pelagic thresher shark *Alopias pelagicus* in the equatorial Pacific. *JMBA*, 94: 1501-1507.
- Sepulveda, C.A., Wang, M., and Aalbers, S.A. 2019. Post-release survivorship and movements of bigeye thresher sharks, *Alopias superciliosus*, following capture on deep-set buoy gear. *Fish. Res.*, 219: UNSP 105312.
- Smith, S.E., Rasmussen, R.C., Ramon, D.A., and Cailliet, G.M. 2008. The biology and ecology of thresher sharks (Alopiidae). *In* Camhi, M.D., Pikitch, E.K., and Babcock, E.A. (eds.), *Sharks of the open ocean. Biology, fisheries and conservation.* Blackwell Publishing, Oxford, UK. 60-68 pp.
- Spear, L. N., Kohin, S., Mohan, J. A., and Wells, R. J. D. 2023. Insights into vertebral band pair deposition rate in the juvenile common thresher shark (*Alopias vulpinus*) in the northeastern Pacific Ocean. *J. Fish. Biol.*, 104: 104-112. Doi: 10.1111/jfb.15538
- 水産庁 (編) . 1993. 平成4年度 日本周辺クロマグロ調査委託事業報告書. 水産庁, 東京. 238 pp.
- 水産庁 (編) . 1994. 平成5年度 日本周辺クロマグロ調査委託事業報告書. 水産庁, 東京. 258 pp.
- 水産庁 (編) . 1995. 平成6年度 日本周辺クロマグロ調査委託事業報告書. 水産庁, 東京. 442 pp.
- 水産庁 (編) . 1996. 平成7年度 日本周辺クロマグロ調査委託事業報告書. 水産庁, 東京. 361 pp.
- 水産庁 (編) . 1997. 平成8年度 日本周辺クロマグロ調査委託事業報告書. 水産庁, 東京. 389 pp.
- 水産庁 (編) . 1998. 平成9年度 日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査委託事業報告書 (別冊資料: まぐろ類等漁獲実態調査結果) . 水産庁, 東京. 304 pp.
- 水産庁 (編) . 1999. 平成10年度 日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査委託事業報告書 (別冊資料: まぐろ類等漁獲実態調査結果) . 水産庁, 東京. 324 pp.
- 水産庁 (編) . 2000. 平成11年度 日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査委託事業報告書-II (別冊資料: まぐろ類等漁獲実態調査結果) . 水産庁, 東京. 315 pp.
- 水産庁 (編) . 2001. 平成12年度 日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査委託事業報告書-II (別冊資料: まぐろ類等漁獲実態調査結果) . 水産庁, 東京. 317 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2017. 平成28年度 国際漁業資源評価調査・情報提供事業 現場実態調査報告書. 水産研究・教育機構, 横浜. 96 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2018. 平成29年度 国際漁業資源評価調査・情報提供事業 現場実態調査報告書. 水産研究・教育機構, 横浜. 96 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2019. 平成30年度 水揚地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜. 93 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2020. 平成31年度 水揚地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜. 97 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2021. 令和2年度 水揚地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜. 98 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2022. 令和3年度 水揚地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜. 99 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2023. 令和4年度 水揚地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜. 96 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2024. 令和5年度 水揚地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜. 93 pp.
- 水産研究・教育機構 (編) . 2025. 令和6年度 水揚地でのまぐろ・かじき・さめ調査結果. 水産研究・教育機構, 横浜. 93 pp.
- 水産総合研究センター (編) . 2002. 平成13年度 日本周辺高度回遊性魚類資源調査委託事業報告書. 水産総合研究センター, 横浜. 286 pp.
- 水産総合研究センター (編) . 2003. 平成14年度 日本周辺高度回遊性魚類資源調査委託事業報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター (編) . 2004. 平成15年度 日本周辺高度回遊性魚類資源調査委託事業報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター (編) . 2005. 平成16年度 日本周辺高度回遊性魚類資源調査委託事業報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター (編) . 2006. 平成17年度 日本周辺高度回遊性魚類資源調査委託事業報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター (編) . 2007. 平成18年度 日本周辺国

- 際魚類資源調査委託事業報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター (編). 2008. 平成19年度 日本周辺国 際魚類資源調査報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター (編). 2009. 平成20年度 日本周辺国 際魚類資源調査報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター (編). 2010. 平成21年度 日本周辺国 際魚類資源調査報告書. 水産総合研究センター, 横浜.
- 水産総合研究センター (編). 2011. 平成22年度 日本周辺国 際魚類資源調査報告書. 水産総合研究センター, 横浜. 186 pp.
- 水産総合研究センター (編). 2012. 平成23年度 水揚地での まぐろ・かじき調査結果. 水産総合研究センター, 横浜. 224 pp.
- 水産総合研究センター (編). 2013. 平成24年度 水揚地での まぐろ・かじき調査結果. 水産総合研究センター, 横浜. 235 pp.
- 水産総合研究センター (編). 2014. 平成25年度 水揚地での まぐろ・かじき調査結果. 水産総合研究センター, 横浜. 230 pp.
- 水産総合研究センター (編). 2015. 平成26年度 水揚地での まぐろ・かじき調査結果. 水産総合研究センター, 横浜. 220 pp.
- 水産総合研究センター (編). 2016. 平成27年度 水揚地での まぐろ・かじき調査結果. 水産総合研究センター, 横浜. 198 pp.
- Teo, S.L.H., Rodriguez, E.G., and Sosa-Nishizaki, O. 2018. Status of common thresher sharks, *Alopius vulpinus*, along the west coast of North America: updated stock assessment based on alternative life history. NOAA Technical Memorandum NMFS. 284 pp. https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/18085/noaa_18085_DS1.pdf(2025年11月4日)
- Varghese, S.P., Unnikrishnan, N., Gulati, D.K., and Ayoob, A.E. 2017. Size, sex, and reproductive biology of seven pelagic sharks in the eastern Arabian Sea. JMBA, 97: 181-196.
- WCPFC. 2017. Summary Report of the Thirteenth Regular Session of the Scientific Committee. liii+ 228 pp.
- Weng, K.C., and Block, B.A. 2004. Diel vertical migration of the bigeye thresher shark (*Alopias superciliosus*), a species possessing orbital retia mirabilia. Fish. Bull., 102: 221-229.
- White, W.T. 2007. Biological observation on lamnoid sharks (Lamniformes) caught by fisheries in eastern Indonesia. JMBA, 87: 781-788.

オナガサメ類（全水域）の資源の現況（要約表）

世界の漁獲量 ^{*1} (最近5年間)	8,427~12,927 トン 最近(2023)年:8,427 トン 平均:11,226 トン(2019~2023年)
我が国の漁獲量 ^{*2} (最近5年間)	37~78 トン 最近(2024)年:38 トン 平均:47 トン(2020~2024年)
資源評価の方法	MIST(maximum impact sustainable threshold)に基づく リスク評価による検討(太平洋ハチワレ) 統合モデルを用いた北米西海岸のマオナガ個体群の 資源評価(北東太平洋:Teo <i>et al.</i> 2018)
資源の状態 (資源評価結果)	漁業の影響がMISTを上回るリスク:20~40%(太平洋ハチワレ) 北米西海岸のマオナガ個体群に対して推定された 漁獲圧の強さは、乱獲状態の指標となる値を大きく 下回り2014年時点の親魚量は開発前のレベルの62% (MSY水準に相当する親魚量を大きく上回る)と推定された。 本系群は乱獲状態になく過剰漁獲の状態にもない (北東太平洋:Teo <i>et al.</i> 2018)
管理目標	検討中
管理措置	船上保持禁止(ICCAT(ハチワレ)、IOTC(全種)) 漁獲物の完全利用等(ICCAT(ハチワレ以外)、WCPFC)
管理機関・関係機関	FAO、ICCAT、IOTC、WCPFC、CCSBT、CITES
最近の資源評価年	2017年(太平洋ハチワレ) 2018年(北米西海岸のマオナガ個体群)
次回の資源評価年	2027年(インディケーター分析:インド洋ハチワレ・ニタリ)

*1 FAOによる統計資料(2019~2023年)に基づく集計値。

*2 我が国主要水揚げ港における水揚量(2020~2024年:ほぼ北太平洋での漁獲量)の集計値。