

クサカリツボダイ 天皇海山海域

North Pacific armorhead *Pentaceros wheeleri*



管理・関係機関

北太平洋漁業委員会 (NPFC)

生物学的特性

- 最大体長・体重：尾叉長 44 cm・1,200 g
- 寿命：7~8 歳
- 性成熟年齢：3 歳（着底後の冬に成熟）
- 産卵期・産卵場：11~2 月・天皇海山海域の水深 300~500 m 水域
- 索餌期・索餌場：北太平洋東部の表層域（未成魚）、天皇海山の水深 300~500 m 水域（成魚）
- 食性：カイアシ類や尾索類等（未成魚）、甲殻類、翼足類、尾索類、魚類等（成魚）
- 捕食者：イワシクジラ、ハワイモンクアザラシ

利用・用途


冷凍ドレスを干物、みそ漬け等に加工。

漁業の特徴

本資源は、天皇海山海域において操業を行っている我が国の底びき網漁業及び底刺網漁業の主対象魚種である。これら漁業は、本種の他にキンメダイ、オオメマトウダイ等を漁獲している。底びき網漁船は水深 300~500 m の平頂海山の頂上部で操業し、底刺網漁船は海山斜面域や水深が深い海山で操業を行っている。天皇海山海域は、1967 年に旧ソ連が漁場開発した。我が国は 1969 年から底びき網漁業を行っている。ソ連漁船は漁獲量が急減した 1978 年以降ほぼ撤退し、年によって操業する程度であった。2004 年以降は韓国漁船が参入した。操業隻数は、近年漁獲低迷に伴い減少している。我が国漁船は 2013 年には底びき網船 6 隻、底刺網船 1 隻であったが、2020 年以降は底びき網船 1 隻、底刺網船 1 隻であった。我が国以外では、2019 年まで韓国の底びき網船が操業していた。

漁獲の動向

開発翌年の 1968 年から 1976 年までの 9 年間の年間総漁獲量は、ソ連と我が国により、1971 年の約 0.9 万トンを除き、約 3.2 万~約 17.8 万トンの高水準で推移した。このうち、我が国は概ね 1 万~3 万トンの高い水準を維持した。その後、総漁獲量は 1977 年には 4,049 トン、1978 年には 876 トンと急減し、以降は我が国により 1,000 トン前後の低い水準で推移したが、1992~1993 年と 2004 年、2008 年、2010 年、2012 年には一時的に急増し、卓越年級群が加入したと考えられている。2013 年以降は加入が少ないために低迷し、2024 年の我が国の総漁獲量は 46 トン、他国の漁獲はなかった。ただし漁獲量の減少には漁業者による狙い操業自粛が影響している可能性がある。




天皇海山海域におけるクサカリツボダイ国別漁獲量の推移 (1968~2024 年)
 開発初期の 1969 年、1970 年、1972 年、1973 年は漁獲量が極端に大きいため、グラフの上部を省略し漁獲量を数字で示した。

資源状態


漁獲量を資源豊度の指標とみなし開発初期を除く1977年以降の最大値と最小値の間を三等分し、16,900トン以上を高位、8,500トン以下を低位とすると、2014年以降は2,000トン以下で低位と判断され、近年は漁業者が狙い操業を自粛しており漁獲量増減が資源動向を直接的に反映しない可能性があることから動向は不明と判断された。2025年に行われた除去法による解析によれば、資源量の低迷と高い漁獲率がっていると推定された。漁船によるモニタリング調査結果及び除去法での推定結果によれば、2019年以降の加入は低水準。

管理方策

本資源の産卵親魚の確保と卓越年級の発生を促進する効果が期待できるよう、本資源と同じ漁業種類で漁獲されるキンメダイの資源解析結果に基づき、1997～2006年の平均漁獲努力量の20%を削減し、底びき網の年間総曳網時間を5,600時間以内に抑えるとともに、本種の産卵時期に当たる11～12月を禁漁期とする(2024年までは11～12月)。さらにC-H海山及び光孝海山南東部の閉鎖や、漁船数の現状凍結等の管理措置も導入されている。2019年以降は順応的管理プロセスに基づいた加入量基準把握のための漁船によるモニタリング調査が実施されている。このモニタリング調査に基づいて、強加入と判断された場合は、漁獲量上限を12,000トン(日本：10,000トン、韓国：2,000トン)とし、さらに強加入年であった2010年及び2012年の半分の漁獲量を占めた天皇海山の特定海域(桓武海山北部及び雄略海山)での底びき網操業を禁止となる。また強加入と判断されない場合については、漁獲量上限を700トン(日本：500トン、韓国：200トン)とする。なお、この漁獲量上限は2019年漁期から推奨漁獲量として適用されていたが、2025年漁期から拘束力のある漁獲枠に変更された。



天皇海山海域の主要海山群
現在北緯45度以北、C-H海山及び光孝海山南東部は操業禁止となっており、ハンコック海山より南東は米国EEZ内にある。



クサカリツボダイの産卵場及び回遊経路の模式図
破線の矢印は仮説的な回遊経路を示す。

クサカリツボダイ（天皇海山海域）の資源の現況（要約表）	
世界の漁獲量 （最近5年間）	25～148トン 最近（2024）年：46トン 平均：67トン（2020～2024年）
我が国の漁獲量 （最近5年間）	25～148トン 最近（2024）年：46トン 平均：67トン（2020～2024年）
資源評価の方法	漁獲量の推移 除去法 漁船によるモニタリング調査
資源の状態 （資源評価結果）	資源状態（漁獲量の推移）： 開発初期を除く1977年以降の漁獲量の最大値と最小値の間を三等分し、 16,900トン以上を高位、8,500トン以下を低位とすると2014年以降の漁獲量は2,000トン以下であり、 資源水準は低位、資源動向は不明 漁獲圧（除去法による評価）： 2010年以降の多くの年・海山について漁獲率が0.5～1.0と高い 加入（モニタリング調査）：2019年以降の加入は低水準
管理目標	加入強度に応じた漁獲による産卵親魚の確保と漁獲の安定 目標値：検討中
管理措置	○NPFC 保存管理措置： ・操業許可漁船数の増加禁止（我が国＝底びき網：7隻以内、底刺網：1隻以内） ・北緯45度以北における操業禁止 ・水深1,500m以深での操業禁止 ・C-H海山及び光孝海山南東部を閉鎖 ・底刺網を海底から70cm以上離して敷設する ・底びき網のコッドエンド目合い13cm以上（5kgの張力をかけて計測） ・産卵期である11～1月の禁漁 ・漁業者から独立した科学オブザーバーの100%乗船 ・加入水準に応じた漁獲量上限を設定するためのモニタリング調査の実施 強加入年の場合：年間総漁獲量上限12,000トン （日本：10,000トン、韓国：2,000トン）、 強加入年であった2010年及び2012年の半分の漁獲量を占めた海山（桓武海山北部及び雄略海山）での 底びき網操業を禁止 強加入年ではない場合：年間総漁獲量上限700トン （日本：500トン、韓国：200トン） ○我が国自主措置： ・刺網の網目の結節から結節までの長さ12cm以上（許可の条件） ・漁獲努力量上限の設定（底びき網年間総曳網時間5,600時間以内）
管理機関・関係機関	NPFC
最新の資源評価年	2025年（除去法）
次回の資源評価年	未定